

Prévention

- **Éliminez tout contact entre les oiseaux d'élevage et les oiseaux sauvages.**
 - Respectez la réglementation sur le [confinement des oiseaux](#).
 - Si possible, gardez vos oiseaux à l'intérieur d'un bâtiment. Si vos oiseaux doivent avoir accès à un enclos extérieur, une barrière physique (ex. : toit, filet) devrait empêcher les oiseaux sauvages de se poser dans l'enclos.
 - Évitez d'attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d'eau.
 - Scellez toutes les ouvertures des bâtiments d'élevage et maîtrisez la vermine et les insectes.
 - Protégez l'équipement, la nourriture et l'eau offerte aux oiseaux d'élevage des fientes ou des sécrétions d'oiseaux sauvages.
- **Assurez-vous d'avoir un [protocole de biosécurité rigoureux](#) en place en tout temps et formez le personnel de l'élevage en matière de biosécurité et de prévention des maladies.**
 - Évitez les contacts avec d'autres oiseaux (ex. : chasse, foire, vente) ou d'autres élevages (ex. : partage de personnel ou visite d'un autre élevage). Ces contacts sont particulièrement à éviter entre les élevages commerciaux et les élevages de basse-cour. Si le contact est inévitable, appliquez de bonnes mesures de biosécurité : vêtements, équipements et chaussures distincts et hygiène des mains.
 - Ne partagez pas d'équipement avec d'autres propriétaires d'oiseaux. Si c'est inévitable, nettoyez et désinfectez le matériel rigoureusement.
 - Appliquez les mesures de protection personnelle recommandées : protection des plaies sur les mains avec un pansement et des gants, combinaison, bottes et hygiène des mains.

Surveillance

Oiseaux sauvages morts ou moribonds

Contribuez à la surveillance de l'influenza aviaire en **signalant la présence d'un oiseau sauvage mort ou moribond en composant le 1 877 346-6763**. Surveillez les alentours de votre élevage quotidiennement. Évitez d'approcher et de manipuler ces animaux en attendant les directives.

Oiseaux d'élevage

Soyez attentif en tout temps à la santé de vos oiseaux et à leur consommation de nourriture et d'eau. Les signes cliniques compatibles avec la grippe aviaire incluent :

- un manque d'énergie et d'appétit;
- une diminution de la production d'œufs et la ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille;
- une enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets;
- une toux, des éternuements et des signes nerveux;
- une diarrhée;
- un manque de coordination;
- une mort subite.